

**INSTITUTION MICHEL**

Directeur A. MICHEL, licencié ès-lettres, 163, rue Judaïque — BORDEAUX  
Préparations : Certificat d'Études (Pharmacie) — Certificat d'Études P. C. N. (Médecine) — Certificat d'Études (École dentaire). — Baccalauréats.  
Écoles vétérinaires.

6<sup>me</sup> ANNÉE

N° 52

AVRIL 1900.

ARCHIVES NATIONALES  
DE  
STOMATOLOGIE  
ET  
**D'ART DENTAIRE**

PARAISANT TOUS LES MOIS

Organe de l'École et des Praticiens de la Province

Il sera rendu compte des ouvrages et thèses dont il sera adressé deux exemplaires et des appareils dont il sera envoyé un spécimen.  
Les auteurs de travaux originaux ont droit à 50 exemplaires tirés à part.

SOMMAIRE

Rôle des anesthésiques, par M. L. CLERC. — Correspondance : par M. G. OUBRERIE. — Leçons sur l'Anatomie de la bouche, professées par M. le Dr G. ROLLAND.

PRIX DE L'ABONNEMENT

UN AN (FRANCE ET ÉTRANGER) : 5 F. — PRIX DU NUMERO : 50 C.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION

Bordeaux — 226, Rue Sainte-Catherine, 226.

M. Louis SEIGLE, Administrateur.

M. Lucien CLERC, Secrétaire de la Rédaction.

**J. PERIE FILS**

TOULOUSE — ALLÉES LAFAYETTE, 44 — TOULOUSE  
Fournitures pour dentistes — Dents minérales de S. S. WHITE et de Asthe  
Fils — Poudre dentifrice de S. S. WHITE — Or en feuille et en cylindres —  
Instruments — Tours à fraiser — Fauteuils — Appareils à vulcaniser. —  
Tours d'atelier — Limes — Plombages métalliques — Ciments, etc.

MÉTAUX PRÉCIEUX - INSTRUMENTS de CHIRURGIE DENTAIRE  
DENTS — CAOUTCHOUCS — PLOMBAGES — OUTILLAGE  
CONTENAU & GODARD FILS, 7, rue du Bouloi. PARIS.

# ÉCOLE ET CLINIQUE DENTAIRES DE BORDEAUX

226, rue Sainte-Catherine, 226

La direction générale des études est basée sur le programme qui forme l'art. 3 du décret du 25 juillet 1893. La scolarité est de trois ans.

L'Ecole admet à titre d'Elèves :

1. Les Étudiants qui postulent le diplôme d'Etat.
  2. Les Étudiants d'une autre Ecole dentaire jouissant des mêmes droits, munis de leurs inscriptions et de leurs examens de fin d'année.
  3. Les Étudiants en médecine, après transformation de leurs inscriptions.
  4. Les Étudiants en médecine munis de douze inscriptions.
  5. Les Praticiens patentés avant la loi de 1892, voulant préparer le diplôme d'Etat.
  6. Les Étrangers ou ceux qui ne désirent pratiquer qu'à l'étranger.
- Les aspirants au diplôme d'Etat doivent produire, pour prendre leur première inscription, soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le décret du 30 juillet 1886, modifié par le décret du 25 juillet 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures.

L'Ecole donne des inscriptions spéciales aux élèves ne désirant pratiquer qu'à l'étranger. Ces inscriptions ne sont pas valables devant les Facultés ; leur remise donne droit au diplôme de l'Ecole dentaire.

---

## CLINIQUE DENTAIRE DU MATIN

Par MM. les Professeurs :

- LUNDI : PHÉLIPEAU**, Chirurgien-dentiste de la Faculté de Bordeaux, Professeur adjoint.  
Chef de Clinique : M. DELAGE-DAMON, chirurgien-dentiste de la Faculté de Bordeaux.  
M. FAYOUX, Chirurgien-dentiste de la Faculté de Paris, professeur libre.  
M. MORTUREUX, démonstrateur.
- MARDI : SEIGLE** aîné, Chirurgien-dentiste de la Faculté de Paris.  
Chef de Clinique : CAYROL, chirurgien-dentiste de la Faculté de Bordeaux.  
M. PEYRE, démonstrateur.
- MERCREDI : BRUGEILLE**, Chirurgien-dentiste de la Faculté de Bordeaux, Docteur en Chirurgie dentaire, du Maryland.  
M. DEHILOTTE, démonstrateur.
- JEUDI : Dr ROLLAND**.  
Chef de Clinique : M. CLERC, Chirurgien-dentiste de la Faculté de Bordeaux, Lauréat de l'Ecole.  
MM. FICHOT, CHEVRIER, démonstrateurs.
- VENDREDI : OUBRERIE**, professeur adjoint, Chirurgien-dentiste de la Faculté de Bordeaux  
BELLOTEAU, DELBÈS, démonstrateurs.

## TRIBUNE PROFESSIONNELLE GRATUITE

Ouverte à MM. les Chirugiens-Dentistes



**A céder** dans la plus grande ville de l'Ouest, un Cabinet dentaire fondé en 1885 et faisant 30,900 fr. d'affaires. — Prix demandé ; 50,000 fr., moitié comptant. On prendrait l'acquéreur comme opérateur mécanicien, pendant deux ou trois ans.

**Cabinet dentaire**, à vendre ou à gérer. Avantagement connu, à 30 kilomètres de Bordeaux. — Prix modérées. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. Merceron, Chirurgien-dentiste, rue d'Arès, 140, Bordeaux.

**Pour cause de décès**, vente du cabinet dentaire de M. GIRONI situé à Nice, 4, rue Masséna. Etabli depuis 30 ans, situation exceptionnellement bonne. — Pour renseignements, s'adresser à M<sup>me</sup> Ve Gironi, 4, rue Masséna.

**Pour cause de décès**, vente d'un bon Cabinet sis à Bordeaux. Exigences modestes. — S'adresser cours Saint-Jean, 60.

**Pour cause de maladie**. A vendre un bon cabinet situé à 40 kilomètres de Bordeaux. Bonnes conditions, S'adresser chez M. Charbonneau, 69, rue de la Devise, Bordeaux.

**Monsieur Perrier-Nédey**, Chirurgien-dentiste patenté, a l'honneur de prévenir MM. les Docteurs et Chirurgiens-dentistes, établis en France, Algérie et Tunisie, qu'il se tient à leur disposition pour l'intérin de leur cabinet, pendant leurs absences, maladies, etc., comme opérateur et mécanicien. Pour tous renseignements et conditions, lui écrire à Marseille, Boulevard Dugommier, 4. Sur demande, sa photographie sera envoyée.

**TRÈS PRESSÉ**. — A céder, pour cause de maladie, un cabinet dentaire situé dans une ville du Midi de 30,000 habitants, pour la valeur du matériel d'exploitation. Prix demandé : 3000 fr. comptant. Bonne clientèle payant bien. Pays vignoble riche. — Excellente affaire pour un célibataire désirant faire un beau mariage. — S'adresser à l'Institut dentaire, 5, rue de la Poste, à Toulouse.

**Bonne et ancienne Pharmacie**, bien située, dans chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cognac, à vendre, bonnes conditions. S'adresser bureau du journal.

**On demande** pour tenir une succursale en province, un opérateur mécanicien patenté. Cabinet à acquérir dans un an ou deux, sans argent. S'adresser à **M. Périé**, 51, boulevard Montparnasse, Paris.

**Pour cause de décès** On demande un bon opérateur et mécanicien américain ou anglais, pour continuer un cabinet de premier ordre. Grande clientèle, situation exceptionnelle. — Appointments fixes et intéressé dans les affaires. S'adresser à Mme Bernard-Mœller, 18, Boulevard Seguin (Oran) Algérie.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE


ANCIENNEMENT GILLIARD, P. MONNET ET CARTIER

SOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL : 6.000.000 DE FR.

— Siège social à LYON, 8, Quai de Retz, 8. —

### LE KÉLÈNE

Est le Meilleur des Anesthésiques



*Anesthésie générale : Narcose. | Anesthésie locale : Névralgie.*

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués.

Demander la littérature spéciale.

### OR DE GENÈVE

L'OR DE GENÈVE, préparé selon le procédé spécial de MM. le Docteur Rédard et Nagy, est chimiquement pur et extrêmement malléable.

Demander la littérature spéciale.

MAISON FONDÉE EN 1859

## VICTOR SIMON & C<sup>IE</sup>

54, Rue Lamartine (Paris) — Téléphone 269-45

Tous instruments et fournitures générales pour dentistes.  
Fauteuils d'opération. -- Meubles dentaires.

### SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

Ciment Silex-Email, Amalgame du Dr Vieta, Fauteuils de Voyage, Eaux, Poudres, Pâtes et Savons dentifrices, Brosses à dents, Flacons émaillés et Boîtes laquées aux noms de MM. les Dentistes.

# Stomatologie et d'Art dentaire

## SOMMAIRE

**Rôle des anesthésiques**, par M. L. CLERC. — **Correspondance** : M. G. OUBRERIE. — **Leçons sur l'Anatomie de la bouche**, professées par M. le Dr G. ROLLAND.

## ROLE DES ANESTHÉSIIQUES

dans les caries du troisième degré.




(5<sup>e</sup> Article)

### La Nirvanine.

La Nirvanine est un produit se présentant à nous sous l'aspect de petits cristaux très fins ; sa couleur a la blancheur du lait, l'odeur est légèrement éthérée. Voici qu'elles sont les propriétés physiques de ce corps qui fut découvert par MM. Einhorn et Heins :

Au point de vue chimique et d'après Einhorn et Heins, il existe dans les combinaisons glyccollées substituées avec un radical alcoolique et surtout dans les combinaisons diéthylglycoliques de l'éther amidé et oxyamidé aromatique, des substances fortement basiques, dont les sels ont une réaction neutre et produisent une anesthésie plus ou moins intense et durable.

La combinaison chimique qui a donné les meilleurs résultats est le chlorhydrate de l'éther diéthylglycol para-amido, représenté par la formule



Ce sel, après dissolution dans l'alcool absolu, cristallise en prismes blancs ; son point de fusion est de 185°.

La Nirvanine est soluble dans l'eau.

Dès l'apparition de la nirvanine, M. Luxemberger a pris des observations sur son pouvoir anesthésique. Il l'a expérimentée en injections hypodermiques et a employé des solutions à diverses concentrations.

Dans un numéro des *Archives Nationales de Stomatologie et d'Art dentaire*, <sup>(1)</sup> nous avons publié le résultat de ces expériences et de celles qui se sont faites dans le service du Docteur Rolland.

Mais ici nous ne parlerons point des injections hypodermiques pour les extractions, mais simplement pour le traitement des caries.

La Nirvanine, étant soluble dans l'eau, va nous permettre de faire des pansements simplement avec de l'eau distillée, et c'est ainsi que nous avons expérimenté, et principalement pour les caries du second degré.

### **La Nirvanine dans les 2<sup>e</sup> degrés.**

D'après les observations prises sur nos malades, nous avons pu remarquer que la nirvanine avait une action réellement analgésiante sur la dentine, nous sommes même arrivés, après quelques pansements, à pouvoir aurifier des seconds degrés très douloureux.

#### **OBSERVATION I (Chevrier).**

M<sup>me</sup> R., 28 ans.

Carie de la canine supérieure gauche ; 2<sup>e</sup> degré, très douloureux, insensibilisation complète après les pansements de nirvanine.

#### **OBSERVATION II**

M. X., 17 ans.

2<sup>me</sup> G. M. S. D. Carie du deuxième degré. Douleurs violentes calmées par les pansements de nirvanine.

#### **OBSERVATION III**

M. D., douanier.

1<sup>re</sup> P. M. I. D. Carie du deuxième degré très douloureuse ; ces pansements de nirvanine n'ont pas donné les résultats attendus, persistance de la douleur.

---

(1) Numéro 40.

#### OBSERVATION IV. (Mortureux).

M<sup>me</sup> C., 29 ans.

2° G. M. I. G. Carie du deuxième degré. Douleurs à la sonde, obturation indolore après pansement de nirvanine.

### La Nirvanine dans les 3<sup>e</sup> degrés.

C'est surtout dans le traitement des caries du troisième degré que la nirvanine est de grande utilité; tout d'abord sa solubilité dans l'eau est déjà un grand point car, pour les pansements, nous n'avons plus besoin d'employer le corps dissolvant qui, quelquefois par son action sur la pulpe, empêche en partie l'action de l'anesthésique.

Associé avec l'acide arsénieux, la nirvanine nous a également donné d'assez bons résultats.

### OBSERVATION I (Routurier).

M<sup>me</sup> R., 43 ans.

Carie du 3<sup>e</sup> degré de la 1<sup>re</sup> P. M. S. D. Pansement arsenical associé à la nirvanine. Pas de douleur pendant la journée. Extraction de la pulpe avec douleur.

## OBSERVATION II

M<sup>me</sup> G., 47 ans.

Pulpite aiguë de la 1<sup>re</sup> P. M. I. D. Douleurs très violentes calmées par les pansements de nirvanine.

### OBSERVATION III

M. R., 19 ans. Etudiant.

Pulpite aiguë de la 1<sup>e</sup> G. M. S. G. Douleurs intenses produites par l'application d'acide arsénieux, analgésie complète de la pulpe après pansement de nirvanine.

### OBSERVATION IV (Mortureux)

Mlle D., 27 ans.

Carie du troisième degré de la C. S. D. Pansement arsenical associé à la nirvanine. Extraction de la pulpe sans douleur.

### OBSERVATION V

**M. C., 27 ans.**

Carie du troisième degré pansement arsenical associé à la nirvanine. Extraction de la pulpe sans douleur.

### OBSERVATION VI (Chevrier).

Mlle J., 17 ans.

Pulpite de l'I. L. S. G. Douleurs violentes calmées par la nirvanine. Pansement arsenical avec nirvanine. Extraction pulpaire indolore.

### OBSERVATION VII

M<sup>me</sup> G..., 23 ans.

Carie du troisieme degre. Douleurs violentes calmées avec un pansement de nirvanine.

### OBSERVATION VIII (Fichot).

M. H., 22 ans, Militaire. Carie du troisième degré de la 2<sup>e</sup> P.  
M. I. D. Pansement arsenical avec nirvanine. Extraction pulpaire  
indolore.

Nous donnons ici quelques observations ; nous ne concluons pas d'après celles-là, car avant de formuler une opinion sur un agent quelconque, il faut un certain nombre d'observations. Donc, contentons-nous de dire que la nirvanine sera peut-être l'anesthésique pulpaire de l'avenir ; mais mettons encore quelques temps à l'ordre du jour pour son étude.

(à suivre)

LUCIEN CLERC.  
*Chirurgien dentiste.*  
*Chef de Clinique*

[illegible][illegible]

Comme Secrétaire de la rédaction du journal de notre chère École, je vous sou mets certaines réflexions que m'a inspiré la lecture de l'article « Réclame et Chirurgien-dentiste, » en date de mars. Vous en ferez ce que vous voudrez, leur donnant l'insertion si elles en valent la peine.

Mes réflexions, mon cher ami, ne s'adressent point au Chirurgien-dentiste; l'âge et la pratique le mettent à même de faire un juste discernement parmi les faits d'intérêt qui touchent sa profession, — mais bien aux étudiants qui, jeunes et influencés par l'âge et le titre, pourraient accepter sans conteste les conseils qui sont donnés dans le dit article, et il pourrait en résulter, à mon sens, une sorte de déconsidération... de notre profession aussi bien qu'un préjudice pécuniaire.

Mes réflexions ou ma controverse, — mais celle-ci pleine de courtoisie et de déférence en considération du but louable de l'auteur de l'article, porteront sur le fond même de la question.



1° Sur l'unification proposée d'un tarif maximum.

2° Sur l'unification de tarif dans le traitement des caries de divers degrés.

Tout de suite je dirai que ces deux propositions sont en désaccord avec le programme de nos études, avec l'élément nouveau du corps des Chirurgiens-dentistes. Autrefois peut-être auraient-elles été logiques.

Le nec plus ultra étant le partage de chaque dentiste, il existait de ces modestes prétentions une sorte de communisme égalitaire de talent, et partant, la rétribution devait être égale ; mais aujourd'hui ou le classement est moins partial étant plus impersonnel, ressort de la clinique, est fait tacitement par les élèves, confirmé toujours au reste par les professeurs, la supériorité doit avoir sa récompense ou alors quels seraient les avantages de l'intelligence, du travail de la valeur personnelle ?

Si nous quettons l'individu pour la masse — nous voyons encore que la mise en vigueur de ces conseils serait illogique et qu'un certain discrédit en rejaillirait sur le corps tout entier.

Vouloir unifier le tarif en tant que maximum, 5 fr., qui dans l'espèce pourrait être considéré comme minimum, n'est-ce pas, en effet, unifier la valeur du travail, créer une sorte de collectivisme dans le talent, matérialiser notre profession, faire de notre travail, de nos soins, une espèce de production mécanique, nier la personnalité, la hiérarchie dans l'art ?

L'unification des prix n'est pas admissible dans la production manuelle ou intellectuelle, ce serait aller contre les lois naturelles, sociales, les idées justement acceptées. Le salaire de cet ouvrier habile n'est-il pas supérieur à tel autre du même corps moins habile ? Y a-t-il uniformité d'honoraires entre les avocats et entre les médecins ?

Pourquoi donc ferions-nous exception nous, qui tenons de l'ouvrier par le travail manuel et des autres, par cette espèce de parenté qui groupe tous ceux dont la profession exige des études et des efforts intellectuels ?

A l'appui de son argumentation l'auteur « Ox, » cite l'état comateux ou est plongé la pharmacie. Vivant dans cette galère j'en connais les tribulations et j'implore les Dieux de garder les Chirurgiens-dentistes d'une telle décadence. Oui, certes, la pharmacie se meurt — mais les causes sont différentes de celles que donne mon honorable confrère. Je ne discuterai pas ici la divergence de nos opinions, l'affaire est classée comme on dit dans d'autres lieux ; je me bornerai à dire, qu'à mon avis, l'exemple est mal choisi.

Peut-on bien en effet, comparer la pharmacie avec la Chirurgie dentaire ?

Ici, c'est le médicament introduit dans le foyer par la spécialité, c'est, dans l'officine, la délivrance de la matière par une main quelconque, sur prescription du médecin ou sur désir du client, enfin sur intervention étrangère.

Dans le cabinet, c'est le Chirurgien-dentiste qui ordonne et administre, c'est la personnalité qui règne et est recherchée. Au fauteuil, les soins




# LEÇONS SUR L'ANATOMIE DE LA BOUCHE

Professées par le Docteur G. ROLLAND

7<sup>e</sup> LEÇON (suite).

## MUSCLES MASTICATEURS

Fig. 35.



Face externe du Masséter.


### Rapports.

*A sa face externe il est recouvert par la peau, quelquefois par un prolongement du peaucier, et enfin par l'aponévrose massétérine.*

L'aponévrose massétérine, celle dont nous venons déjà de parler, se continue en bas avec l'aponévrose cervicale; en haut et en

avant, elle se confond avec le tissu cellulaire ; en arrière, elle se divise en deux lamelles ; la superficielle est l'aponévrose parotidienne, la profonde sépare l'un de l'autre ; le Masséter et le prolongement de la glande parotide.

Fig. 36.



**Coupe horizontale des éléments séparés  
par l'aponévrose massétérine.**

Région parotidienne vue sur une coupe horizontale (côté gauche)

Le *prolongement parotidien* situé à égale distance entre l'arcade zygomatique et l'angle de la mâchoire, sur la face externe du Masséter a la forme d'un cône dont la pointe se rapproche du bord antérieur du muscle. Le *Canal de Sténon* naît de cette pointe, c'est la *portion massétérine* du Canal de Sténon, celle qui précède sa pénétration dans le Buccinateur (portion buccale).

Ce canal est situé dans l'épaisseur de l'aponévrose massétérine, comme d'ailleurs l'*artère transverse de la face* et les divisions du *nerf facial*, dont la direction générale est horizontale et par conséquent perpendiculaire par rapport au Masséter.

La présence de ces trois organes : un canal excréteur, une artère et un nerf, nécessitent des indications pour les opérations chirurgicales sous-aponévrotiques, les seules dangereuses. Et les auteurs donnent comme ligne de repère à ne pas franchir, celle qui s'étendrait du tragus à la commissure buccale.

A sa face interne il recouvre la branche montante du maxillaire inférieur, le *muscle temporal* et le *buccinateur*, dont il est séparé par une boule graisseuse (*boule graisseuse de Bichat*).

Son bord antérieur, dont on peut apercevoir la saillie sous la peau, présente en bas un rapport important avec la faciale qui est appliquée contre le maxillaire inférieur, point où on doit, en cas d'hémorrhagie, la comprimer.

Son bord postérieur est en rapport avec la parotide.

### **Vaisseaux et nerfs.**

Le Masséter reçoit deux artères : l'une de la faciale, l'autre de la maxillaire interne. Ces deux dernières sont des branches de la carotide externe.

Du maxillaire inférieur, branche du trijumeau, il reçoit le *nerf massetérin*. Il faut noter que tous les nerfs masticateurs sont formés par la portion motrice du trijumeau.

### **Action.**

Ce muscle est élévateur par excellence; il imprime à la mâchoire un mouvement de bas en haut et d'arrière en avant; souvenons-nous de la disposition oblique de ces fibres. C'est le muscle des carnassiers, et chez ces animaux sa force est indiquée par l'écartement de l'arcade zygomatique et par les accidents d'insertions, lignes et saillies du maxillaire inférieur.

Le Masséter dispose de la plus grande force quand ses fibres ont atteint la verticale, et ce moment se produit quand la bouche est légèrement entr'ouverte.

Cette direction oblique des fibres musculaires fait comprendre que lorsque la bouche est grandement ouverte et le condyle temporal contre la partie inférieure de la racine transverse de l'arcade zygomatique, une contraction plus énergique peut déterminer la luxation du ménisque, ce qui est dire la luxation du condyle.

D'ailleurs, lorsque la luxation est produite, c'est le Masséter qui joue le plus grand rôle pour maintenir les rapports anormaux.

Il faut noter que tous les nerfs masticateurs sont fournis par la portion motrice du trijumeau.

## TEMPORAL.

### Forme et situation.

Le Temporal ou Crotaphyte de (κροταφος tempe) fosse temporale où il est situé, tire son nom de *tempus temps*. Les anciens voulaient ainsi signaler que là ce faisait la marque de la vie écoulée, en blanchissant les cheveux. La forme de ce muscle large est celle d'un éventail à base tournée en haut.

### Insertions.

*Fixe* à toute l'étendue des deux tiers supérieurs de la fosse temporale et à la moitié supérieure de la face profonde de l'aponévrose temporale qui le recouvre.

*Mobile* au sommet et à la face interne de l'apophyse coronoïde du maxillaire inférieur par un tendon très puissant.


### Direction.

Nées directement de la fosse temporale et de la face interne de l'aponévrose temporale superficielle, ses fibres charnues auxquelles viennent s'adjoindre quelques faisceaux, venus encore de la face interne de l'arcade zygomatique et du tendon d'origine du Masséter, muscle dont il est quelquefois difficile de séparer nettement le temporal, se portent en convergeant, les antérieures obliquement d'avant en arrière, les postérieures d'arrière en avant, les moyennes verticalement sur une aponévrose de terminaison très forte. Cette aponévrose, qui présente elle-même à son origine, la même disposition radiée que le muscle réunit ses fibres pour former le tendon très épais dont nous venons de parler, et qui s'insère à l'apophyse coronoïde par le tendon coronoïdien.

Il faut signaler que le temporal présente, en passant de la fosse temporale pour atteindre l'apophyse coronoïde, un mouvement de réflexion sur la gouttière qui se trouve à la base de l'apophyse zygomatique.

Cruveilhier relate la présence d'un faisceau musculaire très fort qui, de la partie inférieure de la fosse temporale et de la crête qui la borne inférieurement, vient s'insérer, par un tendon distinct à la lèvre interne du bord antérieur de la branche du maxillaire.

Fig. 37.



**Aspect, forme et situation du Temporal.**  
(Muscle de la tête, couche profonde).

### **Rapports.**

A lui seul, ce muscle constitue la région temporale. Il est recouvert par :

*La peau* qui contient dans son épaisseur de nombreux follicules sébacés et est recouverte par des cheveux dans sa moitié postérieure.

*Une couche grasseuse sous-cutanée*, comprenant l'artère et la veine temporale superficielle, le nerf auriculo-temporal, les muscles auriculaires et des filets du facial : Quelques considérations sur l'artère temporale trouveront ici leur place. La présence

superficielle de cette artère justifie cette opinion des gens du monde que les blessures de la région temporale sont mortelles.

A ce sujet, Richet s'exprime ainsi :

« Blandin cherchant à réfuter cette opinion (région dangereuse) si généralement accréditée, pense que l'amincissement des os du crâne en cette région est largement compensée par l'épaisseur des parties molles qui la recouvrent, et si, dit-il, les plaies même superficielles peuvent donner lieu à des hémorrhagies, elles sont facilement arrêtées soit par la ligature, soit par la compression des artères lésées.

Plusieurs faits dont Richet a été témoin, forcent celui-ci à adopter l'opinion opposée. Il pense qu'en raison de la position superficielle des artères temporales qui les expose à être blessés dans une chute sur un corps anguleux ou par un instrument tranchant, doués d'une force suffisante pour entamer les téguments, les plaies de cette région peuvent se compliquer d'hémorrhagies, sinon mortelles, au moins très graves. On n'a pas toujours sous la main un chirurgien pour tordre, lier ou comprimer les artères lésées, et presque toujours les personnes qui entourent le blessé perdent la tête. »


A l'appui de son opinion, il relate le cas d'un ivrogne qui, dans une chute, s'était fait une plaie très peu profonde à la tempe et que des sergents de ville relevèrent dans une mare de sang et conduisirent presque exsangue à l'hôpital Necker. On eut toutes les peines du monde à le rappeler à la vie, il resta quinze jours dans un état adynamique inquiétant. — Je suis convaincu, dit Richet, que relevé une heure plus tard, il n'aurait pas survécu.

Dans ma clientèle, Messieurs, à propos d'une femme tombée sur le rebord d'un comptoir, j'eus à forcipressurer la temporale. L'hémorrhagie avait duré près de deux heures et la malade fut très longue à se remettre.

Je signalerai encore les flexuosités, cette artère et sa prédisposition à la varice artérielle.



Fig. 38.




### Direction et flexuosités de la temporale superficielle.

*Le prolongement de l'aponévrose épicroanienne* est au-dessous très affaibli. Le prolongement dépasse l'arcade zygomatique sans s'y fixer et vient se perdre dans la couche cellulo-graisseuse de la joue.

*L'aponévrose temporale superficielle*, recouverte en haut par l'aponévrose épicroanienne, ne contracte aucune adhérence avec la peau. Elle s'insère par un double feuillet au bord supérieur de l'arcade zygomatique. Les deux feuillets se rejoignent après avoir parcouru le tiers inférieur de l'aponévrose — leur intervalle est rempli de graisse, l'artère temporale moyenne s'y loge et quelques veines aussi — puis cette aponévrose brillante, nacréée, resplendissante, radiée comme le muscle, diminue d'épaisseur et de résistance à mesure qu'elle s'élève et s'insère à la ligne courbe qui borne en haut la fosse temporale. A la partie supérieure et sur sa face interne, cette aponévrose fournit de nombreux points d'insertion aux fibres charnues du temporal; en

Fig. 39



**Aponévrose temporale et rapports artériels des temporales  
et de la ménagée moyenne.**  
Région temporale. (Coupe).



Donc, la méningée moyenne est située sur le même plan que les temporales superficielle et moyenne et justifie l'opinion de Richet sur les dangers de la région. Il signale le cas d'un homme dont la méningée moyenne fut déchirée par un morceau de l'écaille du temporal brisé par un coup de canne plombée. Donc hémorrhagies, contusions cérébrales sont à craindre et l'épaisseur du muscle ne compense pas l'amincissement de l'écaille temporale, et l'instinct public ne s'est point trompé sur la gravité des plaies de cette région.

Ce muscle recouvre encore le ptérigoidien externe, un peu le buccinateur et l'artère maxillaire interne.

### **Vaisseaux et nerfs.**

Il reçoit l'artère temporale profonde antérieure et l'artère temporale profonde postérieure, branche de la maxillaire interne, et l'artère temporale profonde moyenne, branche de la temporale superficielle.

*Ses nerfs* sont : le nerf temporal profond antérieur qui vient du nerf buccal ; le temporal profond moyen du maxillaire inférieur et le temporal postérieur du nerf massétérin.

### **Action.**

Comme le Masséter, le temporal élève la mâchoire. Le premier a une action directe et verticale sur le corps de l'os ; le second une action sur le bras de levier horizontal que présente l'apophyse coronoïde du maxillaire inférieur, il produit un mouvement de bascule. La force s'exerce sur le levier coudé, le point d'appui est sur le condyle ou dans la cavité glénoïde, la résistance sur le corps du maxillaire.

(à suivre).

D<sup>r</sup> G. ROLLAND.



SAMEDI : **MARRONNEAU**, Chirurgien-dentiste, Professeur adjoint.  
DAIGRE, démonstrateur.

A la Clinique du matin est attaché M. **LASSAQUE**, Chirurgien-dentiste de la Faculté de Bordeaux, Chef des travaux de Dentisterie, Surveillant général de l'Ecole.

## COURS THÉORIQUES DU SOIR

Professés à la Faculté de Médecine de Bordeaux.

### SEMESTRE D'ÉTÉ

LUNDI	Dr <b>DUMUR</b> Ancien chef de clinique médicale, Médecin des hôpitaux.	<b>Pathologie interne</b>	8 heures	Faculté
MARDI	<b>Louis SEIGLE</b> Chirurgien-dent.	<b>Prothèse théorique</b>	8 heures	Faculté
	Dr <b>PRINCETEAU</b> Professeur agrégé à la Faculté de médecine, chef des travaux anatomiques, chirurgien des hôpitaux.	<b>Anatomie générale</b>	8 h. 3/4	Faculté
MERCREDI	Dr <b>ROLLAND</b> Directeur de l'Ecole	<b>Anesthésie</b>	4 heures	Ecole
	Dr <b>PEYTOUREAU</b> Docteur en médecine, docteur ès-sciences.	<b>Thérapeutique</b>		
JEUDI	<b>DENOYER</b> chirurgien-dentiste	<b>Conférence</b>	6 heures	Ecole
VENDREDI	<b>OUBRERIE</b> chirurgien-dentiste	<b>Conférence</b>	4 heures	Ecole
	Dr <b>SIGALAS</b> agrégé à la Faculté de Médecine	<b>Physique</b>	8 h. 1/2	St-Raphaël
SAMEDI	Dr <b>FROMAGET</b> Ex-chef de clinique à la Faculté.	<b>Pathologie externe</b>	5 heures	Ecole
	Dr <b>SABRAZÈS</b> Agrégé à la Faculté de médecine.	<b>Bacteriologie.</b>	8 h. 1/2	Faculté

---

# AVIS IMPORTANT

---

Nous avons l'honneur d'informer nos Lecteurs que toutes les communications et tous les renseignements concernant les ARCHIVES NATIONALES DE STOMATOLOGIE ET D'ART DENTAIRE, devront être adressées chez M. LUCIEN CLERC, Secrétaire de la Rédaction, 115, Cours d'Alsace-Lorraine.

---

## COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

Antiseptique, cicatrisant, ni caustique, ni vénéneux.

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

---

Il tonifie les gencives et assainit la bouche d'une façon remarquable. — Les personnes qui en font usage le préfèrent aux solutions phéniquées.

**Prix du flacon : 2 francs.**

---

*Remise d'usage à MM. les Chirurgiens-Dentistes*

---

**Vente en gros, à Bayonne, Pharmacie LE BEUF**

---

**Atelier spécial de Prothèse dentaire à façon.**

---

## A. DOUAT

MÉCANICIEN DENTISTE

**3, Rue de l'Église Saint-Seurin, 3. — BORDEAUX**

N.-B. — M. DOUAT se recommande tout spécialement à MM. les Dentistes par ses prix modérés, le bien fini de son travail et son exactitude dans les livraisons.

**Envoi du prix-courant sur demande.**

---

# **Pâte obturatrice RICHARD**

## **A LA GUTTA-PERCHA**

### **DE L. RICHARD-CHAUVIN & C<sup>o</sup>**

**1. RUE BLANCHE (PARIS)**

---

Les **Guttas Richard** trouvent leur application journalière pour les obturations temporaires et permanentes.

Ces **Guttas** peuvent se comparer avantageusement aux produits similaires, tout en étant beaucoup meilleur marché. Elles sont en vente chez tous les fournisseurs et à la maison principale.

**NOUS RECOMMANDONS SPÉCIALEMENT**

**La Gutta antiseptique Richard, surtout précieuse pour les canaux radiculaires lorsqu'on conserve quelque doute sur la désinfection des racines.**

<b>Pâte obturatrice antiseptique, la boîte....</b>	<b>10 fr.</b>
<b>Pâte obturatrice, la boîte .....</b>	<b>5 fr.</b>

---

## **ANESTHÉSIE LOCALE**

---

## **ERYTHROXYLINE PASSERIEUX**

---

Conservé en ampoules cet anesthésique fidèle, aseptique inaltérable s'emploie avec un succès constant et sans danger dans toutes les opérations de petite chirurgie, en oculistique, en laryngologie, en art dentaire, etc.. etc.

**Les cinq ampoules d'un centimètre cube et demi :**  
**3 fr. 50** la boîte (envoi franco).

---

**Dépôt général : Pharmacie PASSERIEUX, 45, Rue des Faures. — Bordeaux**

---

---

# P. A. KOELLIKER & C<sup>IE</sup>

FOURNITURES POUR DENTISTES

ZURICH  
LYON

GENÈVE  
BORDEAUX

45, rue de la République

18, allées de Tourny

---

Assortiment complet d'articles des premières Maisons

S. S. White Dental Mf & C<sup>o</sup>, C. Ash & Sons, J. Wirth, etc.

---

## PRODUITS SPÉCIAUX DE NOTRE MAISON

---

### CAOUTCHOUCS POUR BASE

Columbian.....	la boîte de 1/2 livre.....F	7	»
Best Para, clair .....	» 1/2 » .....	10	»
— foncé.....	» 1/2 » .....	10	»

### CAOUTCHOUCS POUR GENCIVES

Best Pink clair.....	la boîte de 1/2 livre.....F.	13	25
— foncé.....	» 1/2 » .....	13	25

### CAOUTCHOUCS ÉCLAIR

*Durcissant en 20 et 25 minutes à une température de 175° centigrades.*

Brun clair N° 1.....	la boîte de 1/2 livre.....	10	»
foncé N° 2.....	» 1/2 » .....	10	»
Rose... N° 3 .....	» 1/2 » .....	13	25

## OR SPONGIEUX " SOLILA "

*du Docteur E. de TREY.*

Prix 1/8 d'once .....	F.	26
— 1 » .....		204

### FOULOIRS SPÉCIAUX POUR TRAVAILLER L'OR « SOLILA »

34 formes différentes; prix : pièce .....F. 6.50

**Demander illustrations ou une série de fouloirs aux choix**

Bruxelles spéciales pour l'or « Solila, » la paire...F.	7
Ciseaux spéciaux pour » » » .....	6